



- **Sinónimo** (programa de mejora de variedades de almendro IRTA): "A-205".
- **Origen:** árbol procedente del cruzamiento "Primorskiy" x "Cristomorto", realizado en 1975 en Mas de Bover (Contantí, Tarragona).
- **Varietal protegida:** Título de Obtención Vegetal del MAPA concedido al IRTA. Número de registro 873 (BOE del 25-1-1992).

Características agronómicas

- **Vigor del árbol:** muy vigoroso. Esta característica le permite mantener un buen equilibrio entre la producción y el crecimiento vegetativo.
- **Densidad foliar:** densa.
- **Porte:** medio-erecto.
- **Intensidad de ramificación:** media.
- **Formación y poda:** muy fácil.
- **Localización de los frutos:** principalmente en ramilletes, pero también en brindillas y ramos mixtos.
- **Época de floración:** tardía (similar a "Constantí", "Francolí", "Vairo"). En Mas de Bover 25 días después de "Desmayo Langueta" (media de 12 años de observaciones).
- **Genotipo S de compatibilidad:** S₇S₅.
- **Polinización:** necesita polinización cruzada.
- **Polinizadores:** "Francolí", "Vairo", "Constantí", etc.
- **Intensidad de floración:** abundante.
- **Duración de la floración:** media.
- **Precocidad en la entrada en producción:** precoz.
- **Capacidad productiva:** alta - muy alta.
- **Regularidad en la producción:** buena. Poco alternante.
- **Tolerancia a la sequía:** ha mostrado una buena adaptación al cultivo en climas secos.
- **Tolerancia al "fusicoccum" (*Phomopsis amygdali* Del.):** media.
- **Tolerancia a la "mancha ocre" (*Polystigma ochraceum* Whal.):** media.
- **Época de maduración:** media (comienzos de septiembre en Mas de Bover).
- **Aptitud para la recolección:** buena. En la madurez los frutos se mantienen adheridos a los ramos. Cuando se vibra el árbol se desprenden con facilidad.
- **Facilidad de despellejado:** buena. El pellejo se separa fácilmente de la cáscara.

Características comerciales

- **Forma de la almendra:** elíptica-puntiaguda.
- **Tamaño del grano:** bastante grande (1,4 g).
- **Rendimiento al descascarado:** 29 %
- **Consistencia de la cáscara:** dura.
- **Porcentaje medio de almendras dobles:** casi nulo (1,9 %).
- **Aspecto del grano:** atractivo. Tegumento liso, de grosor medio.
- **Composición del grano repelado:** aceite: 54,9 %; proteína bruta: 24,9 %; azúcares solubles: 2,5 %; fibra bruta: 9,3 %; agua: 4,7 %.

Evaluación global

Árbol de floración tardía, muy productivo, fácil de formar y poco exigente en poda, muy vigoroso, tolerante a la sequía y con fruto de calidad.

