



- **Sinónimo** (programa de mejora de variedades de almendro IRTA): "A-200".
- **Origen:** árbol procedente del cruzamiento "Primorskiy" x "Cristomorto", realizado en 1975 en Mas de Bover (Constantí, Tarragona).
- **Varietal protegida:** Título de Obtención Vegetal del MAPA concedido al IRTA. Número de registro 874 (BOE del 25-1-1992).

Características agronómicas

- **Vigor del árbol:** muy vigoroso. Esta característica le permite mantener un buen equilibrio entre la producción y el crecimiento vegetativo.
- **Densidad foliar:** densa.
- **Porte:** medio-erecto.
- **Intensidad de ramificación:** media.
- **Formación y poda:** muy fácil.
- **Localización de los frutos:** principalmente en ramilletes, pero también en brindillas y ramos mixtos.
- **Época de floración:** tardía (similar a "Ferragnès"). En Mas de Bover 28 días después de "Desmayo Langueta" (media de 12 años de observaciones).
- **Genotipo S de compatibilidad:** S₇S₉.
- **Polinización:** necesita polinización cruzada.
- **Polinizadores:** "Glorieta", "Francolí", "Ferragnès", etc.
- **Intensidad de floración:** abundante.
- **Duración de la floración:** media.
- **Precocidad en la entrada en producción:** media.
- **Capacidad productiva:** alta-muy alta.
- **Regularidad en la producción:** buena. Poco alternante.
- **Tolerancia a la sequía:** muy destacable. Ha mostrado una buena adaptación a condiciones de sequía.
- **Tolerancia al "fusicoccum" (*Phomopsis amygdali* Del.):** muy tolerante.
- **Tolerancia a la "mancha ocre" (*Polystigma ochraceum* Whal.):** media.
- **Época de maduración:** media (primeros días de septiembre en Mas de Bover).
- **Aptitud para la recolección:** buena. En la madurez los frutos se mantienen adheridos a los ramos. Cuando se vibra el árbol se desprenden con facilidad.
- **Facilidad de despellejado:** buena. El pellejo se separa fácilmente de la cáscara.

Características comerciales

- **Forma de la almendra:** elíptica-puntiaguda.
- **Tamaño del grano:** bastante grande (1,35 g).
- **Rendimiento al descascarado:** 28 %
- **Consistencia de la cáscara:** dura.
- **Porcentaje de almendras dobles:** sin dobles (0,4 %).
- **Aspecto del grano:** atractivo. Tegumento liso, de grosor medio.
- **Composición del grano repelado:** aceite: 54,9 %; proteína bruta: 23,0 %; azúcares solubles: 2,7 %; fibra bruta: 7,8 %; agua: 4,4 %.

Evaluación global

Varietal con un conjunto de caracteres de interés. Puede destacarse su excelente vigor, facilidad de formación y poda, floración tardía, capacidad productiva, calidad de fruto y tolerancia a la sequía y al "fusicoccum".

